

BIOTECNO DE COLOMBIA

BOGOTÁ COLOMBIA

biotecno@etb.net.co

18 марта, 2005

ФЕРМА VILLATERE NATURAGRO LTDA.

УЧАСТНИКИ SUBIA

ДЕПАРТАМЕНТ CUNDINMARCA (КОЛУМБИЯ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ **HYDROENZIME XP** начиная с 52 недели

ПОРОДА НЕСУШЕК: ISA BROWN

В диаграмме видно, что зоотехнические параметры, продуктивность и потребление, и максимальная продуктивность, начавшаяся с 22 недели, не достигли идеального уровня продуктивности согласно кривой. Продуктивность не достигла идеального уровня и до 50 недели и радикально снизилась ниже обычных уровней продуктивности к 52 неделе и составляла 86% от обычной продуктивности. В это время было решено добавить в пищу **HYDROENZIME XP** в пропорции 100 гр. /тонну. С 53 недели и далее с использованием **HYDROENZIME XP** наблюдается повышенный уровень продуктивности, который превышает ожидаемый идеальный уровень как указано на диаграмме. На 80 неделе производство яиц все еще было выше этого уровня.

С наилучшими пожеланиями,

LIC.. CARLOS ARMANDO REYES ARMENTA

Президент

BIOTECNO OF COLOMBIA
